

### Regole minime di comportamento per la protezione e prevenzione 1/2

CONTESTO DI LAVORO	DESTINATARI	ATTIVITÀ	TIPOLOGIA DI DPI O MISURE DI PROTEZIONE
	Operatori sanitari	Trasporto sospetto COVID-19 o caso COVID-19 alla struttura sanitaria di riferimento/trasporto interno all'ospedale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mascherina chirurgica / Maschera FFP2 se rischio aumentato per intensità e durata o autambulanza con rianimatore</li> <li>- Camice monouso idrorepellente</li> <li>- Guanti</li> <li>- Occhiali di protezione/ Occhiale a mascherina/ Visiera</li> </ul>
Ambulanza o mezzi di trasporto		Solo guida del mezzo con sospetto o confermato caso COVID-19 a bordo e separazione del posto di guida da quello del paziente senza circuiti di ricircolo dell'aria tra i due compartimenti del mezzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenere la distanza di almeno 1 metro</li> <li>- Non sono necessari DPI</li> </ul>
	Addetti alla guida	Assistenza nelle fasi di carico e scarico del paziente sospetto o confermato caso COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mascherina chirurgica</li> <li>- Camice monouso idrorepellente</li> <li>- Guanti</li> <li>- Occhiali di protezione/ Occhiale a mascherina/ Visiera</li> </ul>
		Nessun contatto diretto con paziente sospetto COVID-19 ma senza separazione del posto di guida da quello del paziente	Mascherina chirurgica
	Paziente con sospetta infezione da COVID-19	Trasporto alla struttura sanitaria di riferimento	Mascherina chirurgica

### Regole minime di comportamento per la protezione e prevenzione 2/2

CONTESTO DI LAVORO	DESTINATARI	ATTIVITÀ	TIPOLOGIA DI DPI O MISURE DI PROTEZIONE
Ambulanza o mezzi di trasporto, trasporto interno con barella	Addetti alle pulizie	Pulizie dopo e durante il trasporto dei pazienti con sospetta infezione da COVID-19 alla struttura sanitaria di riferimento (Alla fine del trasporto del paziente, nel caso in cui sia possibile areare il mezzo, mascherina chirurgica)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mascherina chirurgica</li><li>- Camice monouso idrorepellente</li><li>- Guanti spessi</li><li>- Occhiali di protezione (se presenza rischio schizzi di materiale organico o sostanze chimiche)</li><li>- Stivali o scarpe da lavoro chiuse</li></ul>
Trasporto interno dei pazienti /Altre aree di transito (ad esempio reparti, corridoi)	Tutti gli operatori inclusi gli operatori sanitari	Nessuna attività che comporti contatto con pazienti COVID-19	<ul style="list-style-type: none"><li>- Non sono necessari DPI</li><li>- Indossare mascherina chirurgica e guanti monouso solo in caso di trasporti prolungati (tempo superiore a 15')</li></ul>

CONTESTO DI LAVORO	DESTINATARI	ATTIVITÀ	TIPOLOGIA DI DPI O MISURE DI PROTEZIONE
	Operatori sanitari (Si raccomanda riduzione al minimo del numero di esposti; formazione e addestramento specifici)	Screening preliminare che non comporta il contatto diretto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vetrata / Interfono / citofono.</li> <li>- In alternativa mantenere una distanza dal paziente di almeno 1 metro se possibile o indossare mascherina chirurgica</li> </ul>
		Screening con contatto diretto paziente COVID 19 positivo o sospetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mascherina chirurgica</li> <li>- Camice monouso idrorepellente</li> <li>- Guanti monouso</li> <li>- Occhiali di protezione/ Occhiale a mascherina/ Visiera</li> </ul>
Triage (in ambito ospedaliero per accettazione utenti)	Pazienti con sintomi respiratori		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenere una distanza dall'operatore di almeno 1 metro (in assenza di vetrata e interfono)</li> <li>- Mascherina chirurgica se tollerata dal paziente</li> <li>- Isolamento in stanza singola con porta chiusa e adeguata ventilazione se possibile /</li> <li>Alternativamente, collocazione in area separata sempre a distanza di almeno 1 metro da terzi</li> </ul>
	Pazienti senza sintomi respiratori		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non sono necessari DPI</li> <li>- Mantenere una distanza dagli altri pazienti di almeno 1 metro</li> </ul>

CONTESTO DI LAVORO	DESTINATARI	ATTIVITÀ	TIPOLOGIA DI DPI O MISURE DI PROTEZIONE
Stanza pazienti COVID-19	Operatori sanitari (Si raccomanda riduzione al minimo del numero di esposti; formazione e addestramento specifici)	Assistenza diretta a pazienti COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mascherina chirurgica o Maschera FFP2/FFP3 in specifici contesti assistenziali<sup>1</sup></li> <li>- Camice monouso idrorepellente</li> <li>- Guanti</li> <li>- Occhiali di protezione/ Occhiale a mascherina/ Visiera</li> </ul>
		Procedure che generano aerosol in pazienti COVID-19  Esecuzione tampone oro e rinofaringeo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maschera FFP2/FFP3</li> <li>- Camice monouso idrorepellente</li> <li>- Guanti</li> <li>- Occhiali di protezione/ Occhiale a mascherina/ Visiera</li> </ul>
	Addetti alle pulizie (Si raccomanda riduzione al minimo del numero di addetti esposti; formazione e addestramento specifici)	Accesso in stanze dei pazienti COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mascherina chirurgica</li> <li>- Camice monouso idrorepellente</li> <li>- Guanti spessi</li> <li>- Occhiali di protezione (se presenza rischio schizzi di materiale organico o sostanze chimiche)</li> <li>- Stivali o scarpe da lavoro chiuse</li> </ul>

<sup>1</sup> In contesti assistenziali ove vengono concentrati numerosi pazienti COVID-19, se sottoposti a CPAP/NIV, è necessario il ricorso a FFP2. Anche laddove non sia praticata CPAP/NIV è comunque preferibile, ove disponibili, il ricorso a filtranti facciali in base a una appropriata valutazione del rischio che tenga conto anche del significativo incremento del tempo di esposizione, effettuata a livello della struttura dal datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente

CONTESTO DI LAVORO	DESTINATARI	ATTIVITÀ	TIPOLOGIA DI DPI O MISURE DI PROTEZIONE
Stanza pazienti COVID-19 <sup>1</sup>	Operatori sanitari (Si raccomanda riduzione al minimo del numero di esposti; formazione e addestramento specifici)	Assistenza diretta a pazienti COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mascherina chirurgica o Maschera FFP2/FFP3 in specifici contesti assistenziali<sup>2</sup></li> <li>- Camice monouso idrorepellente</li> <li>- Guanti</li> <li>- Occhiali di protezione/ Occhiale a mascherina/ Visiera</li> </ul>
		Procedure che generano aerosol in pazienti COVID-19 <sup>3</sup>  Esecuzione tampone oro e rinofaringeo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maschera FFP2/FFP3</li> <li>- Camice monouso idrorepellente</li> <li>- Guanti</li> <li>- Occhiali di protezione/ Occhiale a mascherina/ Visiera</li> </ul>

### Stanza pazienti COVID-19<sup>1</sup>

<sup>1</sup> In UTI l'operatore che passa da un paziente ad un altro effettuando procedure differenziate dovrebbe indossare sempre FFP2/FFP3, per un minor consumo di dispositivi o FFP3 o Powered Air Purifying Respirator (PAPR) o sistemi equivalenti

<sup>2</sup> In contesti assistenziali ove vengono concentrati numerosi pazienti COVID-19, se sottoposti a CPAP/NIV, è necessario il ricorso a FFP2. Anche laddove non sia praticata CPAP/NIV è comunque preferibile, ove disponibili, il ricorso a filtranti facciali in base a una appropriata valutazione del rischio che tenga conto anche del significativo incremento del tempo di esposizione, effettuata a livello della struttura dal datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente

<sup>3</sup> Ad esempio rianimazione cardiopolmonare, intubazione, estubazione, broncoscopia, induzione di espettorato, terapie in grado di generare nebulizzazione, NIV, BiPAP, CPAP, tampone nasofaringeo

Addetti alle pulizie (Si raccomanda riduzione al minimo del numero di addetti esposti; formazione e addestramento specifici)	Accesso in stanze dei pazienti COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mascherina chirurgica</li> <li>- Camice monouso idrorepellente</li> <li>- Guanti spessi</li> <li>- Occhiali di protezione (se presenza rischio schizzi di materiale organico o sostanze chimiche)</li> <li>- Stivali o scarpe da lavoro chiuse</li> </ul>
---	---	--

Pazienti

Mascherina chirurgica quando possibile

CONTESTO DI LAVORO	DESTINATARI	ATTIVITÀ	TIPOLOGIA DI DPI O MISURE DI PROTEZIONE
Ambulatori	Operatori sanitari	Esame obiettivo di pazienti con sintomi respiratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mascherina chirurgica o Maschera FFP2/FFP3 in specifici contesti assistenziali<sup>1</sup></li> <li>- Camice monouso idrorepellente</li> <li>- Guanti</li> <li>- Occhiali di protezione/ Occhiale a mascherina/ Visiera</li> </ul>
		Esame obiettivo di pazienti senza sintomi respiratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I DPI previsti per l'ordinario svolgimento della propria mansione con maggiore rischio</li> </ul>
	Pazienti con sintomi respiratori	Mascherina chirurgica	
Pazienti senza sintomi respiratori	Non sono necessari DPI		
Addetti alle pulizie	Dopo l'attività di visita di pazienti con sintomi respiratori areare gli ambienti dopo l'uscita del paziente e prima di un nuovo ingresso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mascherina chirurgica</li> <li>- Camice monouso idrorepellente</li> <li>- Guanti spessi</li> <li>- Occhiali di protezione (se presenza rischio schizzi di materiale organico o sostanze chimiche)</li> <li>- Stivali o scarpe da lavoro chiuse</li> </ul>	

<sup>1</sup> In contesti assistenziali sul territorio ove vengono assistiti numerosi pazienti COVID-19, può essere preso in considerazione il ricorso a FFP2, in base a una appropriata valutazione del rischio che tenga anche conto del significativo incremento del tempo di esposizione, effettuata a livello della struttura dal datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

### Regole minime di comportamento per la protezione e prevenzione 2/2

CONTESTO DI LAVORO	DESTINATARI	ATTIVITÀ	TIPOLOGIA DI DPI O MISURE DI PROTEZIONE
Sale d'attesa	Pazienti con sintomi respiratori		<ul style="list-style-type: none"><li>- Mascherina chirurgica se tollerata</li><li>- Isolare immediatamente il paziente in area dedicata o comunque separata dagli altri / se tale soluzione non è adottabile assicurare la distanza di almeno 1 metro dagli altri pazienti</li></ul>
	Pazienti senza sintomi respiratori		<ul style="list-style-type: none"><li>- Non sono necessari DPI</li><li>- Mantenere una distanza di almeno 1 metro</li></ul>
Accettazione utenti	Operatori sanitari	Screening preliminare senza contatto diretto <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Non sono necessari DPI</li><li>- Mantenere una distanza di almeno 1 metro altrimenti mascherina chirurgica</li></ul>
	Pazienti con sintomi respiratori		<ul style="list-style-type: none"><li>- Mascherina chirurgica se tollerata</li><li>- Mantenere una distanza di almeno 1 metro</li></ul>
	Pazienti senza sintomi respiratori		<ul style="list-style-type: none"><li>- Non sono necessari DPI</li></ul>
	Accompagnatori	Accesso in stanza del paziente senza prestare cure o assistenza diretta	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mascherina chirurgica</li></ul>

<sup>1</sup> Questa categoria include l'utilizzo di termometri senza contatto, termocamere e la limitazione del tempo di osservazione e di domande, il tutto mantenendo una distanza spaziale di almeno 1 metro



### Regole minime di comportamento per la protezione e prevenzione

CONTESTO DI LAVORO	DESTINATARI	ATTIVITÀ	TIPOLOGIA DI DPI O MISURE DI PROTEZIONE
Domicilio del paziente	Operatori sanitari	Assistenza diretta a pazienti COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mascherina chirurgica<sup>1</sup></li> <li>- Camice idrorepellente</li> <li>- Guanti</li> <li>- Occhiali di protezione/ Occhiale a mascherina/ Visiera</li> </ul>
		Procedure che generano aerosol in pazienti COVID-19  Esecuzione tampone oro e rinofaringeo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maschera FFP2/FFP3</li> <li>- Camice idrorepellente</li> <li>- Guanti</li> <li>- Sovrascarpe</li> <li>- Cuffia</li> <li>- Occhiali di protezione/ Occhiale a mascherina/ Visiera</li> </ul>
	Familiare Caregiver	Accesso in stanze dei pazienti COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mascherina chirurgica</li> <li>- Camice idrorepellente</li> <li>- Guanti</li> <li>- Occhiali di protezione (se presenza rischio schizzi di materiale organico o sostanze chimiche)</li> <li>- Stivali o scarpe chiuse</li> </ul>
	Paziente	Attività di vita quotidiana in isolamento domiciliare	Mascherina chirurgica se tollerata dal paziente

<sup>1</sup> In contesti assistenziali omologabili a quelli ospedalieri, quali strutture residenziali ad alta intensità assistenziale, hospice, ospedali di comunità, e altri contesti domiciliari ove siano concentrati pazienti con COVID-19, va preso in considerazione l'utilizzo di FFP2, ove disponibili, anche sulla base di una valutazione del rischio