

Regione Toscana 2025 - Controllo integrato infestanti

DISERBO ARBOREE Mandorlo 2025 v1										
Impianto A attività	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note attività - vincoli	Note attività - consigli	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive
ALLEVAMENTO E PRODUZIONE Fogliare (post emergenza infestanti)	Dicotiledoni e Graminacee	Acido pelargonico	1 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi					VINCOLI: Non ammessi interventi chimici nelle interfile. Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila. La superficie massima diserbabile non deve superare il 30% della superficie totale della coltura.	CONSIGLI: - Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale; - L'uso di diserbanti può essere opportuno quando: - Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%); - Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.	
	Graminacee	Clethodim								
		Quizalofop-p-etile								
		Fluazifop-p-butile								
		Propaquizafop								
Dicotiledoni e polloni	Pyraflufen ethyle									
ALLEVAMENTO (FINO A 3 ANNI) E PRODUZIONE Residuale (pre emergenza infestanti)	Dicotiledoni e Graminacee	<b>Diflufenican</b>								
		<b>Oxyfluorfen</b>								
		<b>Pendimethalin</b>								
		Clomazone								
Dicotiledoni	Isoxaben									
PRODUZIONE Fogliare (post emergenza infestanti)	Dicotiledoni	2,4 D								